

AFP E-Learning

Der Nachweis der Teilnahme wird durch das Beantworten der Fragen erbracht, welche sich ausschließlich auf den Inhalt der entsprechenden E-Learning-Fortbildung beziehen.

1. Nach der Lektüre des Artikels beantworten Sie bitte die Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage gilt dann als richtig beantwortet, wenn alle möglichen richtigen Antworten angekreuzt sind.
2. Schicken Sie diese Seite per E-Mail an die Redaktion von Springer Medizin Wien:
E-Mail: monica.friedmann@springer.at

? Wie hoch ist der durchschnittliche Prozentsatz einer Mangelernährung unter Patient:innen, die im Krankenhaus behandelt werden? (eine richtige Antwort)

- a) 1 %
- b) 10 %
- c) 30 %
- d) 99 %

? Welche nicht-medikamentösen Maßnahmen stehen bei Appetitlosigkeit zur Verfügung? (zwei richtige Antworten)

- a) Hochkalorische Zusatznahrung
- b) Während der Mahlzeiten ausreichend trinken
- c) Bei Übelkeit die Lieblingsessensspeise anbieten
- d) Appetitanregende Getränke wie Ingwertee anbieten

? Wie wird Dronabinol dosiert? (eine richtige Antwort)

- a) 3 x 10 Tropfen als Basistherapie
- b) Ich orientiere mich an der Nierenfunktion
- c) 5 Tropfen als Einzelfallverordnung
- d) Individuell nach dem Leitsatz: „start slow – go slow“

? Wie hoch ist der Prozentsatz der Geschmacksknospen einer: eines 80-Jährigen im Verhältnis zu einer: einem 30-Jährigen? (eine richtige Antwort)

- a) 90 %
- b) 75 %
- c) 55 %
- d) 35 %

? Für welche Medikamente wurde in einer im Podcast besprochenen Studie eine Appetitsteigerung nachgewiesen? (drei richtige Antworten)

- a) Dronabinol
- b) Morphin
- c) Mirtazapin
- d) Megestrol (synthetisches Progesteron-Derivat)

Bitte ausfüllen

Absender:in (Bitte gut leserlich ausfüllen)

Name P-Nummer

Straße/Gasse

Ort/PLZ Altersgruppe <30 41 bis 50
 31 bis 40 51 bis 60 >60